


Analisis Regresi Berganda



Model Linier

$$\begin{aligned}y_i &= \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i \\&= \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ij} + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n\end{aligned}$$

Bentuk L untuk mengestimasi parameter

$$L = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ij} \right)^2 \Rightarrow \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \beta_0}, \dots, \frac{\partial L}{\partial \beta_j}$$

Sehingga dapat diperoleh

$$\begin{array}{ccccccc}n\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_{i1} & + & \hat{\beta}_2 \sum_{i=1}^n x_{i2} & + & \cdots & + & \hat{\beta}_k \sum_{i=1}^n x_{ik} & = & \sum_{i=1}^n y_i \\ \hat{\beta}_0 \sum_{i=1}^n x_{i1} + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_{i1}^2 & + & \hat{\beta}_2 \sum_{i=1}^n x_{i1} x_{i2} & + & \cdots & + & \hat{\beta}_k \sum_{i=1}^n x_{i1} x_{ik} & = & \sum_{i=1}^n x_{i1} y_i \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\ \hat{\beta}_0 \sum_{i=1}^n x_{ik} + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_{ik} x_{i1} & + & \hat{\beta}_2 \sum_{i=1}^n x_{ik} x_{i2} & + & \cdots & + & \hat{\beta}_k \sum_{i=1}^n x_{ik}^2 & = & \sum_{i=1}^n x_{ik} y_i\end{array}$$

Dalam bentuk matriks ...

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i$$
$$= \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ij} + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

Dengan

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nk} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{bmatrix}$$

$$L = \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{\beta}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{y}$$

So...

$$\begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_{i1} & \sum_{i=1}^n x_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^n x_{ik} \\ \sum_{i=1}^n x_{i1} & \sum_{i=1}^n x_{i1}^2 & \sum_{i=1}^n x_{i1}x_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^n x_{i1}x_{ik} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n x_{ik} & \sum_{i=1}^n x_{ik}x_{i1} & \sum_{i=1}^n x_{ik}x_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^n x_{ik}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \vdots \\ \hat{\beta}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_{i1}y_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n x_{ik}y_i \end{bmatrix}$$

Observation Number	Pull Strength y	Wire Length x_1	Die Height x_2	Observation Number	Pull Strength y	Wire Length x_1	Die Height x_2
1	9.95	2	50	14	11.66	2	360
2	24.45	8	110	15	21.65	4	205
3	31.75	11	120	16	17.89	4	400
4	35.00	10	550	17	69.00	20	600
5	25.02	8	295	18	10.30	1	585
6	16.86	4	200	19	34.93	10	540
7	14.38	2	375	20	46.59	15	250
8	9.60	2	52	21	44.88	15	290
9	24.35	9	100	22	54.12	16	510
10	27.50	8	300	23	56.63	17	590
11	17.08	4	412	24	22.13	6	100
12	37.00	11	400	25	21.15	5	400
13	41.95	12	500				

$$X'X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 8 & \cdots & 5 \\ 50 & 110 & \cdots & 400 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 50 \\ 1 & 8 & 110 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 5 & 400 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 206 & 8,294 \\ 206 & 2,396 & 77,177 \\ 8,294 & 77,177 & 3,531,848 \end{bmatrix}$$

$$X'y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 8 & \cdots & 5 \\ 50 & 110 & \cdots & 400 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9.95 \\ 24.45 \\ \vdots \\ 21.15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 725.82 \\ 8,008.37 \\ 274,811.31 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 50 \\ 1 & 8 & 110 \\ 1 & 11 & 120 \\ 1 & 10 & 550 \\ 1 & 8 & 295 \\ 1 & 4 & 200 \\ 1 & 2 & 375 \\ 1 & 2 & 52 \\ 1 & 9 & 100 \\ 1 & 8 & 300 \\ 1 & 4 & 412 \\ 1 & 11 & 400 \\ 1 & 12 & 500 \\ 1 & 2 & 360 \\ 1 & 4 & 205 \\ 1 & 4 & 400 \\ 1 & 20 & 600 \\ 1 & 1 & 585 \\ 1 & 10 & 540 \\ 1 & 15 & 250 \\ 1 & 15 & 290 \\ 1 & 16 & 510 \\ 1 & 17 & 590 \\ 1 & 6 & 100 \\ 1 & 5 & 400 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 9.95 \\ 24.45 \\ 31.75 \\ 35.00 \\ 25.02 \\ 16.86 \\ 14.38 \\ 9.60 \\ 24.35 \\ 27.50 \\ 17.08 \\ 37.00 \\ 41.95 \\ 11.66 \\ 21.65 \\ 17.89 \\ 69.00 \\ 10.30 \\ 34.93 \\ 46.59 \\ 44.88 \\ 54.12 \\ 56.63 \\ 22.13 \\ 21.15 \end{bmatrix}$$

Jadi...

$$\begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 206 & 8,294 \\ 206 & 2,396 & 77,177 \\ 8,294 & 77,177 & 3,531,848 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 725.82 \\ 8,008.37 \\ 274,811.31 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 0.214653 & -0.007491 & -0.000340 \\ -0.007491 & 0.001671 & -0.000019 \\ -0.000340 & -0.000019 & +0.0000015 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 725.82 \\ 8,008.47 \\ 274,811.31 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.26379143 \\ 2.74426964 \\ 0.01252781 \end{bmatrix}$$

Persamaan regresi berganda diperoleh :

$$\hat{y} = 2.26379 + 2.74427x_1 + 0.01253x_2$$

Uji hipotesis pada regresi Ganda

1. Uji signifikansi regresi

- Uji untuk menentukan apakah ada hubungan linier antara variabel respon y dengan regresor $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$

Langkah-langkah :

i.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1: \beta_j \neq 0 \quad \text{for at least one } j$$

ii. Pilih α

iii. Susun tabel ANAVA

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean Square	F_0
Regression	SS_R	k	MS_R	MS_R/MS_E
Error or residual	SS_E	$n - p$	MS_E	
Total	SS_T	$n - 1$		

iv. Tolak H_0 jika $F_0 > F_{\text{tabel}} = F_{\alpha, k, n-p}$

Dengan $SS_E = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \mathbf{e}'\mathbf{e}$

substitusi $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ jadi $SS_E = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\beta}}'\mathbf{X}'\mathbf{y}$

$$SS_T = \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2}{n} = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2}{n}$$

$$SS_E = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2}{n} - \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}'\mathbf{X}'\mathbf{y} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2}{n} \right]$$

$$SS_R = \hat{\boldsymbol{\beta}}'\mathbf{X}'\mathbf{y} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2}{n}$$

Contoh sebelumnya

Pull Strength y	Wire Length x_1	Die Height x_2
----------------------	----------------------	---------------------

$$SS_T = y'y - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2}{n}$$

$$= 27,177.9510 - \frac{(725.82)^2}{25} = 6105.9447$$

$$SS_R = \hat{\beta}'X'y - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2}{n}$$

$$= 27,062.7775 - \frac{(725.82)^2}{25} = 5990.7712$$

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean Square	f_0
Regression	5990.7712	2	2995.3856	572.17
Error or residual	115.1735	22	5.2352	
Total	6105.9447	24		

Karena $f_0 = 572.17 > F_{\text{tabel}} = F_{0.05,2,22} = 3.44$

Maka H_0 ditolak, jadi *pull strength* berhubungan linier dengan *wire length* atau *die height* atau keduanya

R^2 dan adjusted R^2

R-squared disebut juga dengan koefisien determinasi sebagai ukuran statistika kecocokan dengan model, dirumuskan :

$$R^2 = \frac{SS_R}{SS_T} = 1 - \frac{SS_E}{SS_T}$$

Contoh sebelumnya; R-squared=0.9811 = 98.11% menunjukkan Model menerangkan variabilitas variabel respon sebesar 98.11%

Problem. Jika hanya ada x_1 =wire length, R -squared=0.9640, jika ditambah regresor x_2 =die height, R -squared menjadi 0.9811. Jadi selisihnya 0.0171

Masalah → R -squared bertambah ketika regresor bertambah, sulit untuk menentukan kenaikan tsb karena penambahan regresor

→ Alternatif : menggunakan adjusted R -squared

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{SS_E/(n - p)}{SS_T/(n - 1)}$$

- ▶ R_{adj}^2 hanya akan naik jika variabel yang ditambahkan dalam model mengurangi rata-rata kuadrat errornya (RKS)
- ▶ Contoh sebelumnya,

$$R_{adj}^2(x_1, x_2) = 0.979$$

$$R_{adj}^2(x_1) = 0.962$$

→ Penambahan x_2 dalam model relatif berarti