


Bab 2

Distribusi Khusus :
Bernoulli, Binomial, Poisson
dan Normal

Can you think, who'll be the faster catch the fish??



What's distribution we learn for????



Mempelajari distribusi resiko untuk memprediksikan harga premi asuransi



PREDIKSI PENENTUAN JENIS KELAMIN PADA CALON BAYI



Distribusi Bernoulli

Eksperimen dengan hanya dua hasil yang mungkin

Contoh

- melempar mata uang logam satu kali
- Mengamati telur ayam, apakah anak ayam itu jantan atau betina
- Mengamati kedelai yang ditanam, tumbuh atau tidak
- Reaksi obat pada tikus, positif atau negatif

$$P(X = x; p) = p^x (1 - p)^{1-x},$$

dengan $x = 0, 1$ (gagal, sukses) dan p adalah peluang mendapatkan hasil sukses.

Sifat-sifat Eksperimen Bernoulli

- tiap usaha (*trial*) menghasilkan satu dari dua hasil yang mungkin, dinamakan sukses (S) dan gagal (G);
- peluang sukses, $P(S) = p$ dan peluang gagal $P(G) = 1 - p$, atau $P(G) = q$;
- usaha-usaha tersebut independen

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Suatu eksperimen dikatakan terdiri dari n trial Bernoulli jika :

1. Trial saling independen
2. Setiap trial memuat dua kemungkinan yaitu ya atau tidak, sukses atau gagal
3. Probabilitas sukses dinotasikan dengan p

If X is a binomial random variable with parameters p and n ,

$$\mu = E(X) = np \quad \text{and} \quad \sigma^2 = V(X) = np(1-p)$$

contoh

Suatu uang logam yang baik (seimbang) dilempar 4 kali. X adalah banyaknya muka muncul dalam 4 kali pelemparan tersebut.

Pelemparan dipandang sebagai usaha, dan sukses adalah muka muncul. X merupakan variabel random binomial dengan $n = 4$ dan $p = 1/2$ dengan distribusi peluang:

$$P(X = x; 4, \frac{1}{2}) = \binom{4}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{4-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4$$

Contoh

Setiap sampel air yang diambil mempunyai kemungkinan 10% mengandung polutan organik. Asumsikan sampel saling independen maka tentukan probabilitas pada 18 sampel yang diambil terdapat tepat 2 sampel berisi polutan!

$$P(X = 2) = \binom{18}{2} (0.1)^2 (0.9)^{16}$$

DISTRIBUSI POISSON

Variabel random X Poisson dengan parameter $\lambda > 0$ dan fungsi densitas probabilitas (pdf=probability density function) / pmf = *probability mass function*

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots$$

If X is a Poisson random variable with parameter λ , then

$$\mu = E(X) = \lambda \quad \text{and} \quad \sigma^2 = V(X) = \lambda \quad (3-16)$$

Sifat

- banyaknya sukses terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu tidak terpengaruh (bebas) dari apa yang terjadi pada interval waktu atau daerah yang lain,
- peluang terjadinya sukses dalam interval waktu yang singkat atau daerah yang sempit sebanding dengan panjang interval waktu, atau luas daerah dan tidak tergantung pada banyaknya sukses yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut,
- peluang terjadinya lebih dari satu sukses dalam interval waktu yang singkat atau daerah yang sempit tersebut dapat diabaikan.

Cth

Kerusakan pada kabel tembaga berdistribusi Poisson dengan rata-rata 2.3 kerusakan per-mm. Tentukan probabilitas tepat 2 kerusakan dalam 1 mm kabel?

$$P(X = 2) = \frac{e^{-2.3} 2.3^2}{2!} = 0.265$$

Cth

Rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu counter selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di laboratorium adalah 4. Peluang 6 partikel melewati counter dalam suatu milidetik tertentu adalah

$$P(X = 6; \lambda = 4) = \frac{e^{-4} 4^x}{6!} = 0,1042$$

Distribusi Normal (Gaussian)

- Data yang paling banyak digunakan harus mengikuti distribusi Normal, Mengapa?
- Suatu eksperimen random yang diulang maka variabel random akan sama dengan total replikasi akan berkecenderungan mengikuti distribusi Normal → Teorema De Moivre → Teorema Limit Tengah (dipelajari di STATMAT 1)




Figure 4-10 Normal probability density functions for selected values of the parameters μ and σ^2 .


- Suatu variabel random mempunyai distribusi Normal jika pdfnya berbentuk :

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

$$-\infty < \mu < \infty \quad \text{dan} \quad 0 < \sigma < \infty$$


$$E(X) = \mu, \quad V(X) = \sigma^2$$

Sifat 1




- Simetri terhadap sumbu vertikal melalui μ

Sifat 2




- Memotong sumbu mendatar (sumbu x) secara asimtotis

Sifat 3




- Harga maksimum terletak pada $x=\mu$

Sifat 4




- Mempunyai titik belok pada $x = \mu \pm \sigma$

Sifat 5




- Luas kurva Normal sama dengan 1

Menghitung luasan di bawah kurva Normal



$$L = \int_{-\infty}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$



Dapat dihitung menggunakan tabel Normal Standar dengan terlebih dahulu mentransformasikan skala $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ke $Z \sim N(0, 1)$,

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

PDF Normal Standar

Jika $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ maka $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, -\infty < z < \infty$

$$Z \sim N(0,1)$$

A normal random variable with

$$\mu = 0 \quad \text{and} \quad \sigma^2 = 1$$

is called a **standard normal random variable** and is denoted as Z .

The cumulative distribution function of a standard normal random variable is denoted as

$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$

A normal random variable with

$$\mu = 0 \quad \text{and} \quad \sigma^2 = 1$$

is called a **standard normal random variable** and is denoted as Z .

The cumulative distribution function of a standard normal random variable is denoted as

$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$


$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$

Cth

$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$

Misal

$$P(Z \leq 1.5) = \Phi(1.5)$$



z	0.00	0.01	0.02	0.03
0	0.50000	0.50399	0.50398	0.51197
$\vdots$		$\vdots$		
1.5	0.93319	0.93448	0.93574	0.93699


Cth

Distribusi Normal dengan mean $\mu = 60$ dan deviasi standar $\sigma = 12$,
 $N(60, 12^2)$

Hitunglah luas kurva Normal mulai ekor paling kiri ($-\infty$) sampai 76

transformasi dari X ke Z ,

$$\begin{aligned} Z &= \frac{X - \mu}{\sigma} \\ &= \frac{76 - 60}{12} \\ &= 1,33 \end{aligned}$$



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
0.0	0.500000	0.503989	0.507978	0.511967	0.515953	0.519939	0.523922
0.1	0.539828	0.543795	0.547758	0.551717	0.555670	0.559618	0.563559
0.2	0.579260	0.583166	0.587064	0.590954	0.594835	0.598706	0.602568
0.3	0.617911	0.621719	0.625516	0.629300	0.633072	0.636831	0.640576
0.4	0.655422	0.659097	0.662757	0.666402	0.670031	0.673645	0.677242
0.5	0.691462	0.694974	0.698468	0.701944	0.705401	0.708840	0.712260
0.6	0.725747	0.729069	0.732371	0.735653	0.738914	0.742154	0.745373
0.7	0.758036	0.761148	0.764238	0.767305	0.770350	0.773373	0.776373
0.8	0.788145	0.791030	0.793892	0.796731	0.799546	0.802338	0.805106
0.9	0.815940	0.818589	0.821214	0.823815	0.826391	0.828944	0.831472
1.0	0.841345	0.843752	0.846136	0.848495	0.850830	0.853141	0.855428
1.1	0.864334	0.866500	0.868643	0.870762	0.872857	0.874928	0.876976
1.2	0.884930	0.886860	0.888767	0.890651	0.892512	0.894350	0.896165
1.3	0.903199	0.904902	0.906582	0.908241	0.909877	0.911492	0.913085
1.4	0.919243	0.920730	0.922196	0.923641	0.925066	0.926471	0.927855

Cth

Distribusi Normal dengan mean $\mu = 60$ dan deviasi standar $\sigma = 12$,
 $N(60, 12^2)$


Hitunglah luas kurva Normal antara 60 sampai 76



transformasi dari $X = 60$ ke Z ,

$$\begin{aligned} Z &= \frac{X - \mu}{\sigma} \\ &= \frac{60 - 60}{12} \\ &= 0 \end{aligned}$$

transformasi dari $X = 76$ ke Z ,

$$\begin{aligned} Z &= \frac{X - \mu}{\sigma} \\ &= \frac{76 - 60}{12} \\ &= 1,33 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned} P[60 < X < 76] &= P(Z \leq 76) - P(Z \leq 60) \\ &= \Phi(1.33) - \Phi(0) \\ &= 0.9082 - 0.5 \\ &= 0.4082 \end{aligned}$$