Chapter 1

Matriks Aljabar dan Vektor Random

1. Pengantar

2. Penjumlahan, pengurangan, perkalian Matrik dengan skalar

3. Variansi dan Kovariansi Matrik

4. Determinan Matrik

5. Invers Matrik

1. Pengantar

Contoh Matrik:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 & 9 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 5 & 6 & 8 \\ 1 & 4 & 10 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

2×4 4×3 2×2

Misal matrik nilai dalam penelitian pendidikan, akan dinyatakan dalam bentuk matrik 6 subjek dalam 3 variabel

		<i>Variables</i>		
		1	2	3
<i>Subjects</i>	1	10	4	18
	2	12	6	21
	3	13	2	20
	4	16	8	16
	5	12	3	14
	6	15	9	13

Matrik 6 x 3

- Secara umum, matrik $N \times p$ dinyatakan :

		<i>Variables</i>				
		1	2	3	...	p
Subjects	1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	...	x_{1p}
	2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	...	x_{2p}
		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
	N	x_{N1}	x_{N2}	x_{N3}	...	x_{Np}

- Transpos matrik A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 5 & 4 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow A' = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Baris A menjadi kolom A'

Secara umum,
matrik A
berdimensi $r \times s$
maka dimensi
transpose A
adalah $s \times r$

- Matrik dengan baris tunggal disebut dengan vektor baris
- Matrik dengan kolom tunggal disebut dengan vektor kolom
- Vektor biasanya dinyatakan dengan huruf kecil
- Vektor baris dengan tanda transpose $\mathbf{x}'$, $\mathbf{y}'$
- Matrik atau vektor dengan huruf tebal
- Contoh

$$\mathbf{x}' = (1, 2, 3)$$

1 × 3 row vector

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \\ 7 \end{bmatrix} \text{ 4 × 1 column vector}$$

- Misal 100 subjek diukur skor psikologinya, kemudian ditentukan rerata pada 5 subskala. Representasi 5 rerata sebagai vektor kolom dan **transpose** - nya:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 24 \\ 31 \\ 22 \\ 27 \\ 30 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{x}' = (24, 31, 22, 27, 30)$$

Matrik simetrik

- Matrik A dikatakan **simetrik** jika elemen pada diagonal utama merupakan cermin dari elemen di atas diagonal utama. Untuk matrik 3×3 , berarti $a_{12} = a_{21}$, $a_{13} = a_{31}$, $a_{23} = a_{32}$

- Secara general, matrik A simetrik jika $a_{ij} = a_{ji}, i \neq j$
- Contoh

	<i>VR</i>	<i>NA</i>	<i>Cler.</i>	<i>Mech.</i>
Verbal Reas.	1.00	.70	.19	.55
Numerical Abil.	.70	1.00	.36	.50
Clerical Speed	.19	.36	1.00	.16
Mechan. Reas.	.55	.50	.16	1.00

Matrik di atas simetrik

Korelasi VR – NA sama dengan NA-VR

Penjumlahan Matrik

- Matrik dapat dijumlahkan jika mempunyai dimensi yang sama
- Contoh

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2+6 & 3+2 \\ 3+2 & 4+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$$

contoh

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = ??$$

Pengurangan dan perkalian dg skalar

- Pengurangan matrik juga dapat dilakukan jika matrik berdimensi sama

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{A-B} \\ \left[\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 6 \end{array} \right] - \left[\begin{array}{ccc} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc} 1 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array}$$

- Perkalian dengan skalar

$$2(3, 1, 4) = (6, 2, 8) \quad \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$4 \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 20 \end{bmatrix}$$

perkalian Matrik

contoh

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{C} \\ \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} & = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} \\ \begin{matrix} 2 \times 3 \\ \\ \\ \end{matrix} & \begin{matrix} 3 \times 2 \\ \\ \\ \end{matrix} & \begin{matrix} 2 \times 2 \\ \\ \\ \end{matrix} \end{array}$$

- Dua matrik **AB** dapat dikalikan jika jumlah kolom **A** sama dengan baris **B**
- Dua matrik yang dapat dikalikan disebut dengan *conformable*

$$c_{11} \quad (2, 1, 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 2(1) + 1(2) + 3(-1) = 1$$

$$c_{21} \quad (4, 5, 6) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 4(1) + 5(2) + 6(-1) = 8$$

$$c_{12} \quad (2, 1, 3) \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = 2(0) + 1(4) + 3(5) = 19$$

$$c_{22} \quad (4, 5, 6) \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = 4(0) + 5(4) + 6(5) = 50$$

Diperoleh

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 19 \\ 8 & 50 \end{bmatrix}$$

Ingat.. Perkalian matrik tidak berlaku komutatif!

$$AB \neq BA$$

$$\begin{matrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} & & \mathbf{AB} \\ \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot 5 & 2 \cdot 5 + 1 \cdot 6 \\ 1 \cdot 3 + 4 \cdot 5 & 1 \cdot 5 + 4 \cdot 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 16 \\ 23 & 29 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \mathbf{B} & \mathbf{A} & & \mathbf{BA} \\ \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 3 \cdot 2 + 5 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 5 \cdot 4 \\ 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1 & 5 \cdot 1 + 6 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 23 \\ 16 & 29 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Contoh lain

$$\begin{matrix} \mathbf{A} & \mathbf{x} & \mathbf{Ax} \\ \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix} & = \begin{bmatrix} 18 \\ 41 \\ 40 \end{bmatrix} \\ (3 \times 3) & (3 \times 1) & (3 \times 1) \end{matrix}$$

$$(2,5) \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = (11,22)$$

$$(4,2) \begin{bmatrix} 10 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = (46,20) \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 184 + 40 = 224$$